


Vaccination COVID-19 : 3^{ème} dose

Suite aux recommandations du conseil scientifique du 8 juillet et de l'avis de l'HAS du 23 août 2021, un DGS 2021-90 paru le 27/08/2021 recommande d'effectuer une dose de rappel pour les résidents d'EHPAD, au moins 6 mois après la 2^{ème} dose de vaccin.

Pour ce rappel, seuls les vaccins ARN messager = vaccin Comirnaty® de Pfizer-BioNTech ou avec le vaccin Spikevax® de Moderna pourront être utilisés (meilleure efficacité par rapport au variant delta) indépendamment du vaccin utilisé lors de la primo-vaccination.

L'HAS a validé la possibilité de réaliser le même jour la vaccination antigrippale et contre la COVID.

Différents situations



Procédure de vaccination en cas de cluster ou découverte d'un cas :

Un résident cas confirmé	Ne doit pas être vacciné
Un résident symptomatique sans confirmation de l'infection	Faire test biologique de type PCR ou test antigénique. La décision de vaccination sera prise en fonction du résultat
Résident contact à risque	Attendre le résultat du J7 pour réaliser la vaccination
Un résident asymptomatique	Peut être vacciné en l'absence de contre-indication

La décision de vaccination est prise par le médecin de l'ESMS qui peut recourir à une expertise de différents acteurs (LUTIN 72, infectiologues, ARS...)

Obligation vaccinale des résidents en EHPAD :

Pas d'obligation vaccinale pour les résidents d'EHPAD, toute personne a le droit de refuser dans la mesure où il est en capacité de faire des choix pour lui-même. Cela signifie également qu'après chaque sortie en famille, il sera contraint à une limitation des activités collectives et un **test RT-PCR à 7 jours.**

Conservation des vaccins ARN messenger :

- Le vaccin Comirnaty® de Pfizer-BioNTech : Si flacon décongelé et non reconstitué, il peut être conservé au réfrigérateur entre 2 et 8°C, **pendant 30 jours.** Reconstitué peut être conservé 6h entre 2 et 30°C.
Transport : Une fois décongelé et reconstitué, le vaccin peut être transporté dans une boîte isotherme entre 2° et 8°C. Ne pas dépasser 6h de transport entre 2° et 30°C sans secouer.
- Le vaccin Spikevax® de Moderna : Si flacon décongelé et non ouvert, il peut être conservé au réfrigérateur entre 2°et 8°C, **pendant 30 jours** et à l'abri de la lumière. Après sortie du réfrigérateur, il peut être conservé entre 8° et 25°C pendant 12h. Le Flacon ouvert, peut être conservé pendant 6h entre 2° et 25°C.
Transport : Une fois décongelé, il peut être transporté dans une boîte isotherme entre 2° et 8°C. 12h en véhicule moteur, 1h à pied